

Come eseguire

Scotch-Test/Test di Graham:

L'esame deve essere eseguito al mattino, preferibilmente il prima possibile, prima di lavarsi o defecare, al fine di catturare le uova e/o le larve, facendole aderire alla superficie adesiva dello scotch.


Si raccomanda di munirsi di un nastro adesivo trasparente (scotch) da far aderire a un vetrino, mentre può recarsi nei nostri centri per reperire vetrini e bastoncini di legno. È importante non utilizzare nastri adesivi opachi, colorati o satinati.

La sera prima dell'esame, evitare l'applicazione di creme o talco nella zona perianale.


Le uova degli ossiuri sono appiccicose e altamente infettive, pertanto è necessario indossare guanti protettivi durante tutte le fasi della raccolta del campione.

Procedura:

- 1.** Tagliare un pezzo di nastro adesivo trasparente poco più corto del vetrino (circa 5-6cm)
- 2.** Piegarlo delicatamente il nastro adesivo intorno all'estremità del bastoncino, assicurandosi che la parte adesiva sia rivolta verso l'esterno
- 3.** Tendendo il bastoncino con la mano destra, posizionare il nastro adesivo sulla superficie perianale, esercitando una leggera pressione per circa 15-20 secondi per raccogliere eventuali uova



4. Dopo aver completato la raccolta, staccare delicatamente il nastro dal bastoncino e fissarlo sul vetrino, evitando la formazione di bolle d'aria



5. Strofinare delicatamente il nastro adesivo utilizzando un batuffolo di cotone per farlo aderire completamente alla superficie del vetrino

N.B

Non sono idonei campioni con nastro adesivo imbrattato o con bolle d'aria tra il nastro e il vetrino.

La ricerca deve essere effettuata su almeno 3 vetrini, prelevati preferibilmente al mattino.

Conservare i campioni raccolti in frigorifero e consegnarli rapidamente al laboratorio per evitare il deterioramento.